

Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации

ФГБОУ ВО "Казанский государственный аграрный
университет"

Институт "агроэкологии и земельных
ресурсов"

Кафедра "растениеводства"

ТЕТРАДЬ

для контрольной работы

по дисциплине

ученик "Растениеводство"

В-86 школы

Вотколки студент
курса
группа БВЗ-02
доцент кафедры
зап. книжка: А323086
Курица летов Ф.З
Григорьев: Вадим
Григорьев Р.И.

Казань 2022

22. Требования ошмытой ржи к предшественникам. Осуществление разрезов а в севообороте. Каким предшественников разрыхляется ошмытой ржи в Ваших кол-вах, районе? Их преимущества и недостатки.

Требования ошмытой ржи к предшественникам: она должна предоставлять к плодородию почвы, может расти на мелкоплодородном или неплодородном почвах и во время вегетации повышает плодородие.

Осуществление разрезов ошмытой ржи в севообороте.

- В районом недостаточного увлажнения
- В районом достаточного увлажнения ошмытой ржи обычно разрыхляют по земельной парам: после многолетних

прав второго года повторились
на один унх, повороту красна
многочисленные прав, после выдвиг
суща, горюха на земле, односторонний
прав.

- Наметаются и увеличивается повар
жидкого районов Мисржидовой зоны
всехми урочища оршовой ржи китфит
по издрядному праву.

- В южной речке как ее можно
сделать после поворота, дается и
др. дровот.

Некоторое количество кружков
дрядовой ржи: кавр, кавр + мисржид
ка, жидки на шов, карбани на шов
согово-злаково и согово-приморщ
ное кружков на землю мисржид, ржи
карбонель, кружков на шов, горюх,
всего, урочища: жидки, урочища,
лени.

42. Предоставляя дереву пиление и
предоставляя. Также пиление предст-
вляющих возделывают дерево пиление
в области хв. в. районе, на при-а
и подотаме.

Дерево пиления представляет собой
поп предоставляя предоставляя,
много копий от корня, обильности
которой в области и пиления в области
в области.

Некоторые коряги предоставляя
дерево пиления: зернового орудия
и много пиления в области
правой, правой, правой, левой пиления,
с правой.

Сахарная свёкла и картофель
попоставляя в области на пиление
пиление в области пиления
внесения удобрений. На пиление пер-
квал пиления пиления пиления

почво.

И государственными предприятиями
относительно многолетних трав
создаются поля, зерновые, кормовые
культуры, клевер, сено и травы
мелкая пашня и т.д. за река загоры
параллельно сенокосам, как культура
своими руками разными
факторами.

Второй видовой травой пашня
состоит из: зерновых, кормовых
и т.д. и т.д. и т.д. и т.д.
на 50 лет и т.д.

Информация о том, после каких
предприятий возводятся травяные
пашни в конкретном районе
или районе, найти не удалось.

20. Прогованне преса в ринську
китань с формами здовження. Системи
здовження преса, призначене в вашій
суді, район, її функціональність і
недостатки

Преса велика переважно к
розробці нових. Для кожного нормального
розвитку необхідно достаточне
кількість достаточних розмірів
фінансових витрат. Преса дає
високі урожаї на землях, де є
організований виробничий, який
кількістю або якістю і якістю
кількістю розмірів. Оскільки воно
широке, задовольняє, велике
кількістю земель. Преса всім
культуру отримати структурно.
хорошо організоване погано в
содержанні перекладів
кількістю величезної, величезної

акжов, средние и мелкие сумки
Три разработанные шельфы удобрений
кислот проливали, чтобы
на формирование из зерна и воды
субстанции количества соломки
курдюки и популяции 3-3,2 кг азота,
1,3-1,5 кг фосфора, 2-2,4 кг калия,
1-1,3 кг кальция. Получают питатель-
ные вещества вращены в течение
всего периода вегетации.

Врагательского периода развития
происходит существенно к
недостатку фосфора из курдюки
первые всего покрывают азотом
(7-8% общей потребности) и в за-
висимости от породы - калий, кальций,
фосфор. Наиболее интенсивно
растения поглощают минеральные
вещества из почвы - азот, фосфор.

В это время происходит усиленный
рост вегетативной массы и форми-
руются листочки, поэтому для растений
обеспеченность прося именно в эти
фазы азотом, фосфором и кали-
ем - одно из важнейших.

Четвертое формирование соевых
продуктивных. В этот период
в растении накапливается 70% азота,
80% фосфора и практически весь
калий. Наибольшее коли-
чество фосфора увеличивается в
последний период вегетации, когда
формируются зерна. В этот период
накапливается сахар (крахмал), в состав
которого входит фосфор.

В питании прося сугубительно
разношерстными минеральными
веществами, калием, фосфором, магнием, цинком

миз, мотуши. Сие новонакони,
активност разнотих формул,
успорити витимиче прореса
вратилих, саопштеном шмиту
уведет, берно, алашмилот и
витаминов.

Три иштенивност: амеркорони
везденом прое шетали прима
вони удрените доника предукат.
ривато, прима кесо, корнуо амен.
генноме цуноуруа основноме
фленталли еликареном кирани
до поугени мануруе месо урени
а киче вудани опашмалном
уловити уренидоме фуденитв
носо ишорудовали китанином
вечунов иу ково и удренити. Кандо
се фуденитиво удренити, пак
уфитно, дитинфити лине урениуно

основной целью является
всесовершенство. Из основных ве-
щих: эффективность применения
минеральных удобрений и средств
химической защиты растений
приводят агрохимики к
и фитосанитарное оздоровление
почвы по следующим основным
направлениям и разработкам науки и тех-
ники по следующим направлениям
химического оздоровления и защиты
растений

Научно обоснованное применение
удобрений почве на посеве зерна
составляет для каждого поля
по следующим основным принци-
пам.

1. Проведение агрохимического обследования участка
и составление агрохимического
паспорта, с учетом содержания минеральных

повышая рейтинг, ее механической
состав, содержание организационного
ресурса, многообразие и структурно-
генная сложность, содержание
дополнительной формы формирования,
наличием почти основными
2. Величина мероприятий по повыше-
нию организационного структуриро-
ванного типа, которые вносят
в себя нейтральную. многообразие
лучше представляется и принимаются
организации удовлетворены под предприня-
тыми прокуратуры самоуправления,
лучше - вливания некое, нулевым
под углом.

14. Посев сахарной свеклы. Выбор
сроков сева. Способ посева. Густота
посева. Глубина посева и т.д. Влияние
предпосевных агротехнических приемов в
различных районах при посеве
сахарной свеклы, их эффективность.

Выбор срока сева сахарной свеклы
зависит от района:

- Северного Поволжья - 3-4 мая - 1
декабря апреля.

- Центрально-Черноземное общество -
2-3 мая апреля.

- Восточное общество Центрального
Черноземья, Черноземье и Поволжье -
3-4 мая апреля - 1-2 мая июля.

Способ посева - рядами с междуряд-
ными расстояниями 45-
и ширинами 20-50 см.

Густота посева зависит от урожая:

Для охунтуринского населения, соединяющая долину с долиной реки во время, орошающим способом - 8-12 рядов на 1 м рядов, что свидетельствует, что расстояние 5-7 рядов и не требует прополки.

- На основном способе нужно вводить семя с некоторой силой 12-15 рядов на 1 м, и удалить лишние всходы лишними рядами. Трудно посеять семя вручную от кова.

Трудно посеять семя вручную от кова.

- На основном способе, много прополки, вода и воздух, сильная муфта, почти не вращается, почти не вращается на глубину 2-2,5 см

100. пригование лена к условиям
произрастания: температура, влажность,
свету, почве, элементам питания.
Всего основан широты
векров с уроками.

1. Температура. При малом
культуре сравнительно устойчивая,
но более подвержена к перепадам,
чем при дожде, особенно в период
созревания. Уменьшение количества
температур за период вегетации
(62-120 дней) должно составлять
1000-1100 °C. Величина колебаний
происходит при температуре почвы
+3°C, более низкая температура поч-
вы +3°C, более высокая температура и
повышенная влажность почвы сильно
способствуют их загниванию.

2. Влажность. При произрастании сильно
влаголюбива, но не более 10%. Вода от

составной массы. Максимальное
поп. в воду пш. покрывает в среднем
внутреннюю, цветную и отражающую
поверхности, когда идет активное обра-
зование зерновой массы растений.

В ср. за вегетацию на образование
14 семян пш. затрачивается до 1000
водо.

3. Свет. Пш. растения длинного дня.
Сильно солнечное освещение способствует
увеличению времени цветения, что сни-
жает урожайность и ухудшает его
качество.

4. Пова. Пш. критично зависит от сорня-
ков зерновок. Критично для пш.
разрастание злаковых замещающих
полюс, а также ранние всходы
и всхожесть.

5. Примерно читались. Мы наивнее
интенсивно концентрируем из нас
теплоту чтения во время чтения
и осуждения предрассудков орг-
анизм. Потребность в работе возрастает
сража, «слон» и формирует мнени-
е во время чтения. Фасер и
нашей потребности чтения сработ-
кой востановит законно сработавше,
особенно вступая от аутопизации
до образования шланга.