



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«Казанский государственный аграрный университет»  
(ФГБОУ ВО КАЗАНСКИЙ ГАУ)

Институт механизации и технического сервиса  
Кафедра физики и математики



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«Математика»  
(Оценочные средства и методические материалы)

приложение к рабочей программе дисциплины

Направление подготовки  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Направленность (профиль) подготовки  
«Государственная и муниципальная служба»

Форма обучения  
Очная, очно-заочная

Казань – 2021


Составитель: доцент кафедры физики и математики, к.т.н.  Зиннатуллина А. Н.

Оценочные средства обсуждены и одобрены на заседании кафедры физики и математики  
«12» мая 2021 (протокол № 9)

Заведующий кафедрой физики и математики, д.т.н., профессор  Ибятов Р.И.

Рассмотрены и одобрены на заседании методической комиссии Института механизации и  
технического сервиса «14» мая 2021 г. (протокол № 9)

Председатель методической комиссии:  
доцент кафедры ЭиРМ, к.т.н., доцент  Шайхутдинов Р.Р.

Согласовано:  
Директор Института механизации  
и технического сервиса,  
д.т.н., профессор  Яхин С.М.

Протокол Ученого совета ИМиТС № 10 от «17» мая 2021 г.

## 1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению обучения 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Математика»:

Таблица 1.1 – Требования к результатам освоения дисциплины

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи	<p><b>Знать:</b> типовую (инвариантную) структуру задачи и возможные варианты реализации этой структуры; знает различные типологии задач, понимает классификационные признаки, лежащие в основе этих типологий; осознает особенности решения задач различных типов</p> <p><b>Уметь:</b> анализировать задачу, выделять условие и задание (вопрос), соотносить предложенную задачу с тем или иным известным типом, определять необходимые для решения задачи знания, умения, дополнительные сведения</p> <p><b>Владеть:</b> умением формулировать и анализировать научную задачу, выделять ее содержательные части и этапы реализации</p>
ОПК-5. Способен использовать в профессиональной деятельности информационно-коммуникационные технологии, государственные и муниципальные информационные системы; применять технологии электронного правительства и представления государственных (муниципальных) услуг	ОПК-5.3. Способен ставить и решать прикладные задачи с использованием современных информационно-коммуникационных технологий	<p><b>Знать:</b> основные направления использования информационно - коммуникационных технологий, назначение и возможности информационно-коммуникационных технологий при решении прикладных задач и проведении научно-исследовательской деятельности</p> <p><b>Уметь:</b> эффективно использовать существующие информационно-коммуникационные технологии при решении прикладных задач и в научно-исследовательской деятельности</p> <p><b>Владеть:</b> навыками решения прикладных задач в образовательной и научно-исследовательской деятельности с использованием существующих информационно-коммуникационных технологий</p>

## 2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

Таблица 2.1 – Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценка уровня сформированности			
		неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично
УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи	<b>Знать:</b> типовую (инвариантную) структуру задачи и возможные варианты реализации этой структуры; знает различные типологии задач, понимает классификационные признаки, лежащие в основе этих типологий; осознает особенности решения задач различных типов	Пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные ошибки при ответе на вопросы и в решении задачи	Знание основного программного материала в минимальном объеме, погрешности непринципиального характера в ответе на вопросы и в решении задачи	Полное знание программного материала, усвоение основной литературы, рекомендованной в программе, наличие малозначительных ошибок в решении задачи, или недостаточно полное раскрытие содержания вопроса	Всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, усвоение основной и дополнительной литературы, правильное решение задачи
	<b>Уметь:</b> анализировать задачу, выделять условие и задание (вопрос), соотносить предложенную задачу с тем или иным известным типом, определять необходимые для решения задачи знания,	Частично освоенное умение анализировать задачу, выделять условие и определять необходимые для решения задачи знания	В целом успешное, но не систематические применения знаний, умений, дополнительных сведений, необходимые для решения задачи знания, умения, дополнительные сведения	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы в умениях определять необходимые для решения задачи знания, умения, дополнительные сведения	Сформированное умение в применении необходимых для решения задачи знаний, умений, дополнительных сведений

	умения, дополнительные сведения				
	<b>Владеть:</b> умением формулировать и анализировать научную задачу, выделять ее содержательные части и этапы реализации	Имеются грубые ошибки при владении умением формулировать и анализировать научную задачу	Имеется минимальный набор навыков при формулировке и анализе научной задачи, выделении ее содержательных частей и этапов реализации	Продемонстрированы базовые навыки при формулировке и анализе научной задачи, выделении ее содержательных частей и этапов реализации	Продемонстрированы уверенные систематические владения в формулировке и анализе научной задачи, выделении ее содержательных частей и этапов реализации
ОПК-5.3. Способен ставить и решать прикладные задачи с использованием современных информационно-коммуникационных технологий	<b>Знать:</b> основные направления использования информационно - коммуникационных технологий, назначение и возможности информационно-коммуникационных технологий при решении прикладных задач и проведении научно-исследовательской деятельности	Слабая сформированность знаний в использовании информационно - коммуникационных технологий, назначении и возможностях информационно-коммуникационных технологий при решении прикладных задач	В основном знания проявляются, однако представляют собой разрозненное, поверхностное и не систематизированное представление о информационно - коммуникационных технологиях, назначениях и возможностях информационно - коммуникационных технологий при решении прикладных задач	Наличие твердых знаний при недостаточно уверенноном владении некоторыми понятиями, законами и методами информационно - коммуникационных технологий	Глубокие и всесторонние знания, достаточно уверенное владение всеми понятиями и методами информационно-коммуникационных технологий при решении прикладных задач и проведении научно-исследовательской деятельности
	<b>Уметь:</b> эффективно использовать существующие информационно - коммуникационные технологии при решении приклад-	Слабая сформированность знаний о существующих информационно - коммуникационные технологиях	Наличие основных умений, однако допускаются отдельные ошибки и погрешности при решении прикладных задач	Уверенные умения в использовании существующих информационно - коммуникационные технологии при решении прикладных задач, но при этом до-	Уверенные умения в использовании существующих информационно - коммуникационных технологий при решении прикладных задач и в научно-исследовательской де-

	ных задач и в научно-исследовательской деятельности			пускаются нарушения последовательности действий и недостаточно полное использование понятий, свойств и определений	ятельности
	<b>Владеть:</b> навыками решения прикладных задач в образовательной и научно-исследовательской деятельности с использованием существующих информационно-коммуникационных технологий	Слабое владение основными методами решения прикладных задач в образовательной и научно-исследовательской деятельности с использованием существующих информационно - коммуникационных технологий	Владение навыками решения прикладных задач в образовательной и научно-исследовательской деятельности, но при этом проявляется фрагментарность и непоследовательность, ошибки и недочеты в простейших прикладных задачах	Уверенное владение основными навыками решения прикладных задач в образовательной деятельности с использованием существующих информационно - коммуникационных технологий	Уверенное владение основными навыками решения прикладных задач в образовательной и научно - исследовательской деятельности с использованием существующих информационно - коммуникационных технологий

Описание шкалы оценивания:

1. Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине.

2. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора.

3. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности.

4. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний.

5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовлетворительно».

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно»

### **3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Таблица 3.1 – Типовые контрольные задания соотнесенные с индикаторами достижения компетенций

Индикатор достижения компетенции	№№ заданий (вопросов, билетов, тестов и пр.) для оценки результатов обучения по соотнесенному индикатору достижения компетенции
УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи	Вопросы к экзамену и зачету в тестовой форме, в устной форме и образцы контрольных работ, относящиеся к разделам 1-4
ОПК-5.3. Способен ставить и решать прикладные задачи с использованием современных информационно-коммуникационных технологий	Вопросы к экзамену и зачету в тестовой форме, в устной форме и образцы контрольных работ, относящиеся к разделам 5-6

#### **3.1. Вопросы к экзамену и зачету в тестовой форме**

##### **Раздел 1. Элементы линейной и векторной алгебры**

1. Система линейных алгебраических уравнений называется совместной, если
  - А) она не имеет ни одного решения
  - Б) она имеет хотя бы одно решение
  - В) если свободные члены этой системы равны нулю
  - Г) если ранг матрицы этой системы равен 1

2. Система линейных алгебраических уравнений называется несовместной, если

- А) она не имеет ни одного решения
- Б) она имеет хотя бы одно решение
- В) если свободные члены этой системы равны нулю
- Г) если ранг матрицы этой системы равен 1

3. Система линейных алгебраических уравнений называется определенной, если:

- А) ранг этой системы равен 1
- Б) если она имеет единственное решение
- В) если она имеет более одного решения
- Г) если она не имеет решений

4. Система линейных алгебраических уравнений называется неопределенной, если

- А) ранг этой системы равен 1
- Б) если она имеет единственное решение
- В) если она имеет более одного решения
- Г) если она не имеет решений

5. Теорема Кронекера-Капелли утверждает, что система линейных алгебраических уравнений  $AX = B$  совместна тогда и только тогда, когда

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| А) $r(A) = r(A/B)$ | Б) $r(A) \neq r(A/B)$ |
| В) $r(A) < r(A/B)$ | Г) $r(A) > r(A/B)$    |

6. Пусть дана система линейных алгебраических уравнений  $AX = B$  и  $r(A) = r(A/B) = n$  где  $n$ -число неизвестных системы. Тогда:

- А) система не определена
- Б) система совместна и определена
- В) система однородная
- Г) система совместна и не определена

7. Пусть дана система линейных алгебраических уравнений  $AX = B$  и  $r(A) = r(A/B) < n$  где  $n$ -число неизвестных системы. Тогда:

- А) система не определена
- Б) система совместна и определена
- В) система однородная
- Г) система совместна и не определена

8. Система линейных алгебраических уравнений  $AX = B$  несовместна тогда, когда:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| А) $r(A) = r(A/B)$ | Б) $r(A) \neq r(A/B)$ |
| В) $r(A) < r(A/B)$ | Г) $r(A) > r(A/B)$    |

9. Любая невырожденная матрица имеет обратную матрицу следующего вида:

$$\text{А) } A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} \quad \text{Б) } A^{-1} = |A| \cdot \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}$$

$$\text{Б) } A^{-1} = \frac{1}{|A^T|} \cdot \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} \quad \text{Г) } A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix}$$

10. Если  $A$  и  $B$  - квадратные матрицы,  $A$  - невырожденная, то решение матричного уравнения  $AX = B$  имеет вид

А)  $X = B \cdot A^{-1}$       Б)  $X = A^{-1} \cdot B$       В)  $X = A^{-1} \cdot B^{-1}$       Г)  $X = A \cdot B^{-1}$

11. Три вектора в пространстве называются компланарными, если они

- А) лежат в одной плоскости или на параллельных плоскостях
- Б) лежат на одной прямой или на параллельных прямых
- В) имеют равные длины и параллельны друг другу
- Г) имеют равные длины и лежат в одной плоскости

12. Два вектора  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  называются коллинеарными, если они

- А) лежат в одной плоскости или на параллельных плоскостях
- Б) лежат на одной прямой или на параллельных прямых
- В) имеют равные длины и параллельны друг другу
- Г) имеют равные длины и лежат в одной плоскости

13. Два вектора  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  называются равными, если они

- А) коллинеарные, имеют равные длины и направление
- Б) имеют равные длины
- В) имеют равные длины и коллинеарные
- Г) имеют равные длины и лежат в одной плоскости

14. Модуль вектора  $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$  вычисляется по формуле:

$$\begin{array}{ll} \text{А) } |\vec{a}| = a_x^2 + a_y^2 + a_z^2 & \text{Б) } |\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \\ \text{В) } |\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} & \\ \text{Г) } |\vec{a}| = \sqrt{a_x \cdot a_y \cdot a_z} & \end{array}$$

15. Скалярное произведение двух векторов  $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$  и  $\vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$  вычисляется по формуле:

$$\begin{array}{ll} \text{А) } \vec{a} \cdot \vec{b} = a_x \cdot b_x + a_y \cdot b_y + a_z \cdot b_z & \text{Б) } \vec{a} \cdot \vec{b} = a_x \cdot a_y \cdot a_z + b_x \cdot b_y \cdot b_z \\ \text{В) } \vec{a} \cdot \vec{b} = \sqrt{a_x \cdot a_y \cdot a_z} + \sqrt{b_x \cdot b_y \cdot b_z} & \text{Г) } \vec{a} \cdot \vec{b} = \sqrt{a_x + a_y + a_z} + \sqrt{b_x + b_y + b_z} . \end{array}$$

16. Косинус угла  $\alpha$  между векторами  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  вычисляется по формуле:

$$\text{А) } \cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} \quad \text{Б) } \cos \alpha = \frac{\vec{a} + \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} \quad \text{В) } \cos \alpha = \frac{\vec{a} \times \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} \quad \text{Г) } \cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| + |\vec{b}|}$$

17. Векторным произведением двух векторов  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  называется:

А) третий вектор  $\vec{c}$ , длина которого численно равна площади параллелограмма, построенного на векторах  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  как на сторонах, направленный перпендикулярно плоскости, образованной векторами  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$

Б) третий вектор  $\vec{c}$ , длина которого численно равна площади треугольника, построенного на векторах  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  как на сторонах, направленный перпендикулярно плоскости, образованной векторами  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$

В) третий вектор  $\vec{c}$ , длина которого численно равна площади треугольника, построенного на векторах  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  как на сторонах, направленный параллельно плоскости, образованной векторами  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$

Г) третий вектор  $\vec{c}$ , длина которого численно равна площади параллелограмма, построенного на векторах  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  как на сторонах, направленный параллельно плоскости, образованной векторами  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$

18. Площадь треугольника, построенного на векторах  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$ , вычисляется по формуле:

$$A) S = |\vec{a} \times \vec{b}| \quad B) S = \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}| \quad C) S = |\vec{a} \cdot \vec{b}| \quad D) S = \frac{1}{2} |\vec{a} \cdot \vec{b}|$$

19. Формула вычисления векторного произведения вектора  $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$  на вектор  $\vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$  имеет вид:

$$A) \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \vec{k}$$

$$B) \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \vec{k}$$

$$C) \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} \vec{k}$$

$$D) \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} \vec{k}$$

20. Если вектора  $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$  и  $\vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$  коллинеарные, то справедливо следующее равенство:

$$A) \frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z}$$

$$B) a_x \cdot b_x + a_y \cdot b_y + a_z \cdot b_z = 0$$

$$C) a_x \cdot b_x + a_y \cdot b_y + a_z \cdot b_z = 1$$

$$D) |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| = 0$$

21. Если вектора  $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$  и  $\vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$  перпендикулярны, то справедливо следующее равенство:

$$A) \frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z}$$

$$B) a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = 0$$

$$C) a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = 1$$

$$D) |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| = 0$$

22. Смешанным произведением трех векторов  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  и  $\vec{c}$  называется:

А) скалярное произведение векторного произведения векторов  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  на вектор  $\vec{c}$

Б) скалярное произведение суммы векторов  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  на вектор  $\vec{c}$

В) векторное произведение вектора  $\vec{a}$  на сумму векторов  $\vec{b}$  и  $\vec{c}$

Г) скалярное произведение вектора  $\vec{a}$  на сумму векторов  $\vec{b}$  и  $\vec{c}$

23. Смешанное произведение трех векторов  $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$ ,  $\vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$  и  $\vec{c} = (c_x, c_y, c_z)$  вычисляется по формуле:

$$A) \vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$$

$$B) \vec{a}\vec{b}\vec{c} = |\vec{a}| + |\vec{b}| + |\vec{c}|$$

$$B) \vec{a}\vec{b}\vec{c} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot |\vec{c}|$$

$$\Gamma) \vec{a}\vec{b}\vec{c} = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2$$

24. Геометрический смысл смешанного произведения трех векторов заключается в том, что оно равно:

- A) длине диагонали параллелепипеда, построенного на этих векторах;
- Б) объему параллелепипеда, построенного на этих векторах;
- В) длине вектора, равного сумме этих трех векторов;
- Г) площади параллелограмма, построенного на двух векторах перпендикулярно третьему вектору.

25. Формула вычисления объема треугольной пирамиды имеет вид:

$$A) V = \frac{1}{3} \vec{a}\vec{b}\vec{c}$$

$$B) V = \frac{1}{2} \vec{a}\vec{b}\vec{c}$$

$$B) V = \frac{1}{6} \vec{a}\vec{b}\vec{c}$$

$$\Gamma) V = \vec{a}\vec{b}\vec{c}$$

## Раздел 2. Аналитическая геометрия на плоскости

1. Угол между прямыми, заданными уравнениями  $y = k_1x + b_1$  и  $y = k_2x + b_2$ , вычисляется по формуле:

$$A) \operatorname{tg} \varphi = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2}$$

$$B) \operatorname{tg} \varphi = \frac{k_2 - k_1}{1 - k_1 k_2}$$

$$B) \operatorname{tg} \varphi = \frac{k_2 + k_1}{1 + k_1 k_2}$$

$$\Gamma) \operatorname{tg} \varphi = \frac{k_2 + k_1}{1 - k_1 k_2}$$

2. Если прямые, заданные уравнениями  $y = k_1x + b_1$  и  $y = k_2x + b_2$ , перпендикулярны, то угловые коэффициенты удовлетворяют равенству:

$$A) k_2 = \frac{1}{k_1}$$

$$B) k_2 = -\frac{1}{k_1}$$

$$B) k_1 = k_2$$

$$\Gamma) k_1 = -k_2$$

3. Если прямые, заданные уравнениями  $y = k_1x + b_1$  и  $y = k_2x + b_2$ , параллельны, то угловые коэффициенты удовлетворяют равенству:

$$A) k_2 = \frac{1}{k_1}$$

$$B) k_2 = -\frac{1}{k_1}$$

$$B) k_1 = k_2$$

$$\Gamma) k_1 = -k_2$$

4. Расстояние от точки  $M_0(x_0, y_0)$  до прямой  $Ax + By + C = 0$  вычисляется по формуле:

$$A) d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

$$B) d = \frac{|Ax_0 + By_0|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

$$\text{B) } d = |Ax_0 + By_0 + C| \quad \Gamma) \quad d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

### Раздел 3. Введение в анализ

1. Производной функции  $y = f(x)$  в точке  $x_0$  называется:

$$\text{A) } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}; \quad \text{Б) } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{x} \quad \text{В) } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x_0)}{x - x_0} \quad \Gamma) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x}$$

2. Производная  $f'(x)$  в точке  $x$  есть:

- А) касательная к графику функции  $y = f(x)$  в точке  $x$ ;
- Б) угол между касательной к графику функции и положительным направлением оси  $Ox$ ;
- В) угловой коэффициент касательной к графику функции  $y = f(x)$  в точке  $x$ .

3. Если функция  $f(x)$  непрерывна на отрезке  $[a;b]$ , дифференцируема на интервале  $(a;b)$ , то найдется хотя бы одна точка  $c \in (a;b)$  такая, что выполняется равенство:

- А)  $f(a) - f(b) = f'(c)(b-a)$
- Б)  $f(b) - f(a) = f'(c)(b-a)$
- В)  $f(b) - f(a) = f'(c)(a-b)$

4. Если функция  $f(x)$  непрерывна на отрезке  $[a;b]$ , дифференцируема на интервале  $(a;b)$  и на концах отрезка принимает одинаковые значения  $f(a) = f(b)$ , то найдется хотя бы одна точка  $c \in (a,b)$ , в которой производная:

- А)  $f'(c) = 0$
- Б) не существует
- В)  $f'(c) = 1$

5. Если функции  $f(x)$  и  $\varphi(x)$  непрерывны на отрезке  $[a,b]$ , дифференцируемы на интервале  $(a;b)$ , причем  $\varphi'(x) \neq 0$  для  $x \in (a;b)$ , то найдется хотя бы одна точка  $c \in (a,b)$  такая, что выполняется равенство:

$$\text{А) } \frac{f(b) - f(a)}{\varphi(b) - \varphi(a)} = \frac{f'(c)}{\varphi'(c)} \quad \text{Б) } \frac{f(a) - f(b)}{\varphi(b) - \varphi(a)} = \frac{f'(c)}{\varphi'(c)} \quad \text{В) } \frac{\varphi(b) - \varphi(a)}{f(b) - f(a)} = \frac{f'(c)}{\varphi'(c)}$$

6. Для вычисления приближенных значений функций используется формула:

- А)  $f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x) \cdot \Delta x$ ;
- Б)  $f(x) \approx f(\Delta x) + f'(\Delta x) \cdot \Delta x$ ;
- В)  $f(x + \Delta x) \approx f'(x) \cdot \Delta x$ .

7. Если вторая производная  $f''(x)$  при переходе через точку  $x_0$ , в которой она равна нулю или не существует, меняет знак, то точка графика с абсциссой  $x_0$  есть:

- А) точка перегиба
- Б) точка максимума
- В) точка минимума

8. Если функция  $f(x)$  дифференцируема на интервале  $(a;b)$  и  $f'(x) > 0$  для  $\forall x \in (a;b)$ , то эта функция:

- А) убывает
- Б) возрастает
- В) выпукла вниз

9. Если функция  $f(x)$  дифференцируема на интервале  $(a;b)$  и  $f'(x) < 0$  для  $\forall x \in (a;b)$ , то эта функция:

- А) убывает      Б) возрастает      В) выпукла вниз

10. Если непрерывная функция  $y=f(x)$  дифференцируема в некоторой  $\delta$ -окрестности критической точки  $x_0$  и при переходе через нее (слева направо) производная  $f'(x)$  меняет знак с минуса на плюс, то  $x_0$  есть точка:

- А) максимума      Б) минимума      В) перегиба

11. Если непрерывная функция  $y=f(x)$  дифференцируема в некоторой  $\delta$ -окрестности критической точки  $x_0$  и при переходе через нее (слева направо) производная  $f'(x)$  меняет знак с плюса на минус, то  $x_0$  есть точка:

- А) максимума      Б) минимума      В) перегиба

12. Угловой коэффициент наклонной асимптоты  $y=kx+b$  к графику функции  $y=f(x)$  вычисляется по формуле:

А)  $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$       Б)  $k = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$       В)  $k = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

14. Выберите верное утверждение:

А)  $(uv)' = u'v - uv'$       Б)  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v + uv'}{v^2}$   
 В)  $\left(\frac{C}{v}\right)' = -\frac{C}{v^2}$       Г)  $\left(\frac{C}{v}\right)' = \frac{C}{v^2}$

15. Выберите ложное утверждение:

А)  $d(u+v) = du+dv$       Б)  $d(uv) = udu+vvdv$   
 В)  $d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{vdu - udv}{v^2}$       Г)  $d(uv) = vdu+udv$

#### Раздел 4. Интегральное исчисление функций одной независимой переменной

1. Функция  $F(x)$  является первообразной для функции  $f(x)$  на некотором промежутке, если в любой точке этого промежутка выполняется равенство:

- А)  $F'(x) = f'(x)$       Б)  $F(x) = f(x)dx$       В)  $F'(x) = f(x)$

2. Совокупность всех первообразных  $F(x)+C$  для функции  $f(x)$  называется:

- А) дифференциалом  $f(x)$   
 Б) определенным интегралом  
 В) неопределенным интегралом

3. К интегрируемым функциям относятся все:

- А) постоянные      Б) непрерывные      В) прерывные

4. Если  $\int f(x)dx = F(x) + C$ , то выполняется:

- А)  $F(x) = f'(x)$       Б)  $F(x) = f(x)dx$       В)  $d(F(x) + C) = f(x)dx$

5. Производная от неопределенного интеграла равна:

A)  $\left(\int f(x)dx\right)' = F(x)$       Б)  $\left(\int f(x)dx\right)' = F(x) + C$       В)  $\left(\int f(x)dx\right)' = f(x)$

6. Дифференциал от неопределенного интеграла равен:

А)  $d(\int f(x)dx) = f(x)dx$       Б)  $d(\int f(x)dx) = f(x)$       В)  $d(\int f(x)dx) = F(x) + C$

7. Неопределенный интеграл от дифференциала некоторой функции равен

А)  $\int dF(x) = F(x)$       Б)  $\int dF(x) = F(x) + C$       В)  $\int dF(x) = f(x)$

8. Неопределенный интеграл от алгебраической суммы конечного числа непрерывных функций равен:

А)  $\int (f(x) + \varphi(x))dx = \int f(x)\varphi(x)dx - f(x)$   
 Б)  $\int (f(x) + \varphi(x))dx = \int f(x)dx - \int \varphi(x)dx$   
 В)  $\int (f(x) + \varphi(x))dx = \int f(x)dx + \int \varphi(x)dx$

9. Интеграл  $\int kf(x)dx$  равен:

А)  $k + \int f(x)dx$       Б)  $k \int f(x)dx$       В)  $k^2 \int f(x)dx$

10. Интегрирование по частям в неопределенных интегралах выполняется по формуле:

А)  $\int u dv = uv - \int v du$       Б)  $\int u dv = uv + \int v du$       В)  $\int u dv = uv - \int u dv$

11. Рациональная дробь называется правильной, если

- А) степень числителя равна степени знаменателя
- Б) степень числителя меньше степени знаменателя
- В) степень числителя больше степени знаменателя
- Г) степень числителя и степени знаменателя равны единице

## Раздел 5. Функции нескольких переменных

1. Частная производная по  $x$  от функции  $z = f(x; y)$  определяется равенством:

А)  $z'_x = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x; y) - f(x + \Delta x; y)}{\Delta x};$

Б)  $z'_x = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x; y) - f(x; y)}{\Delta x};$

В)  $z'_x = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x; y + \Delta y) - f(x; y)}{\Delta x}.$

2. Частная производная по  $y$  от функции  $z = f(x; y)$  определяется равенством:

А)  $z'_y = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x; y)}{\Delta y};$

Б)  $z'_y = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x; y) - f(x, y + \Delta y)}{\Delta y};$

B)  $z'_y = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x; y + \Delta y) - f(x; y)}{\Delta y}$ .

3. Формула для вычисления приближенных значений имеет вид:

A)  $f(x + \Delta x; y + \Delta y) \approx f(x + \Delta x; y + \Delta y) + f'_x(x, y)\Delta x + f'_y(x, y)\Delta y$ ;

B)  $f(x; y) \approx f(x + \Delta x; y + \Delta y) + f'_x(x, y)\Delta x + f'_y(x, y)\Delta y$ ;

B)  $f(x + \Delta x; y + \Delta y) \approx f(x; y) + f'_x(x, y)\Delta x + f'_y(x, y)\Delta y$ .

4. Точка  $(x_0; y_0)$  называется точкой максимума функции  $z = f(x; y)$ , если существует такая  $\delta$ -окрестность точки  $(x_0; y_0)$ , что для каждой точки  $(x, y)$ , отличной от  $(x_0; y_0)$ , из этой окрестности выполняется неравенство:

A)  $f(x; y) \geq f(x_0, y_0)$       B)  $f(x; y) < f(x_0, y_0)$       C)  $f(x; y) > f(x_0, y_0)$

5. Точка  $(x_0; y_0)$  называется точкой минимума функции  $z = f(x; y)$ , если существует такая  $\delta$ -окрестность точки  $(x_0; y_0)$ , что для каждой точки  $(x, y)$ , отличной от  $(x_0; y_0)$ , из этой окрестности выполняется неравенство:

A)  $f(x; y) > f(x_0, y_0)$       B)  $f(x; y) < f(x_0, y_0)$       C)  $f(x; y) \geq f(x_0, y_0)$

6. Если в точке  $N(x_0; y_0)$  дифференцируемая функция  $z = f(x; y)$  имеет экстремум, то ее частные производные в этой точке:

A)  $f'_x(x_0; y_0) = 0, f'_y(x_0; y_0) = 0$

B)  $f'_x(x_0; y_0) \neq 0, f'_y(x_0; y_0) = 0$

B)  $f'_x(x_0; y_0) \neq 0, f'_y(x_0; y_0) \neq 0$

7. Если  $z = f(x; y)$ , а  $x = x(t)$ ,  $y = y(t)$ , то

A)  $\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}$       B)  $\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}$       C)  $\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial t}$

8. Если  $z = f(x; y)$ , а  $x = x(u, v)$ ,  $y = y(u, v)$ , то

A)  $\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{du} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{du}$       B)  $\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial u}$       C)  $\frac{dz}{du} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{du} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{du}$

9. Если  $z = f(x; y)$ , а  $x = x(u, v)$ ,  $y = y(u, v)$ , то

A)  $\frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial v}$       B)  $\frac{dz}{dv} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dv} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dv}$       C)  $\frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dv} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dv}$

36. Частные производные  $\frac{\partial z}{\partial x}$  и  $\frac{\partial z}{\partial y}$  неявной функции  $z$ , заданной уравнением

$F(x, y, z) = 0$  имеют вид:

A)  $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z};$       B)  $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_y}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_x}{F'_z};$       C)  $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_z}{F'_x}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_z}{F'_y}.$

## Раздел 6. Теории вероятностей и основы математической статистики

1. Два размещения считаются различными, если они отличаются  
 А только порядком расположения элементов  
 Б) только составом элементов  
 В) только числом элементов  
 Г) или составом элементов, или их порядком
2. Два сочетания считаются различными только в том случае, если  
 А) у них все элементы различны  
 Б) отличаются порядком расположения элементов  
 В) отличаются двумя элементами  
 Г) отличаются хотя бы одним элементом
3. Перестановка  $P_n$  – это  
 А) сочетание из  $n$  элементов по  $n$   
 Б) сочетание из  $n$  элементов по 0  
 В) размещение из  $n$  элементов по  $n$   
 Г) размещение из  $n$  элементов по 1
4. Число размещений  $A_n^m$  вычисляется по формуле:  
 А)  $\frac{n!}{m!(n-m)!}$       Б)  $\frac{n!}{(n-m)!}$       В)  $n!$
5. Число размещений  $C_n^m$  вычисляется по формуле:  
 А)  $\frac{n!}{m!(n-m)!}$       Б)  $\frac{n!}{(n-m)!}$       В)  $n!$
6. Число размещений  $P_n$  вычисляется по формуле:  
 А)  $\frac{n!}{m!(n-m)!}$       Б)  $\frac{n!}{(n-m)!}$       В)  $n!$
7. Случайным называется событие  $A$ , которое  
 А) может произойти, а может не произойти  
 Б) никогда не произойдет  
 В) обязательно произойдет  
 Г) произойдет только совместно с событием  $\bar{A}$
8. События  $A$  и  $B$  называются зависимыми, если  
 А) сумма их вероятностей обязательно равна 1  
 Б) вероятности событий  $A$  и  $B$  не зависят друг от друга  
 В) вероятность наступления одного из событий зависит от появления или не появления  
 другого  
 Г) они происходят одновременно
9. События  $A$  и  $B$  называются несовместными, если  
 А) вероятность наступления одного из событий зависит от появления или не появления  
 другого  
 Б) появление одного из них исключает появление другого  
 В) сумма их вероятностей никогда не равна 1

Г) если одновременно они могут появиться только конечное число раз

10. Рассматривается пространство из  $N$  элементарных событий. Событию  $A$  благоприятствуют  $M$  элементарных событий. Классическая вероятность события  $A$  равна

А)  $\frac{N}{M}$       Б)  $1 - \frac{N}{M}$       В)  $\frac{M}{N}$       Г)  $1 - \frac{N}{M}$

11. Произведено  $n$  испытаний. Событие  $A$  произошло  $m$  раз. Относительная частота события  $A$  равна

А)  $W(A) = \frac{n}{m}$       Б)  $W(A) = 1 - \frac{m}{n}$       В)  $W(A) = \frac{m}{n}$       Г)  $W(A) = m \cdot n$

12. Вероятность  $P$  любого события принадлежит отрезку

А)  $[1;2]$       Б)  $[0;2]$       В)  $[1;4]$       Г)  $[0;1]$

13. Сумма вероятностей событий, образующих полную группу, равна

А) 0      Б)  $1/2$       В) 1      Г) 4

14. Два события называются противоположными, если они

- А) независимы  
Б) не совместны  
В) единственно возможны  
Г) образуют полную группу событий

15. События образуют полную группу событий, если являются

- А) независимыми  
Б) единственно возможными и независимыми  
В) несовместными и единственно возможными  
Г) несовместными и равновозможными

16. Суммой событий  $A$  и  $B$  называется событие  $C$ ,

которое происходит, если происходят:

- А) только событие  $A$   
Б) только событие  $B$   
В) одно из событий  $A$  или  $B$   
Г) оба события  $A$  и  $B$

17. Произведением событий  $A$  и  $B$  называется событие  $C$ ,

которое происходит, если происходит:

- А) только событие  $A$   
Б) только событие  $B$   
В) одно из событий  $A$  или  $B$   
Г) оба события  $A$  и  $B$

18. Обязательным условием применения формулы  $P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)$  является

- А) независимость события  $A$  и  $B$   
Б) события  $A$  и  $B$  единственно возможны  
В) события  $A$  и  $B$  противоположны  
Г) совместность событий  $A$  и  $B$

19. Обязательным условием применения формулы  $P(A+B)=P(A)+P(B)$  является

- А) независимость события  $A$  и  $B$   
 Б) несовместность событий  $A$  и  $B$   
 В) события  $A$  и  $B$  единственно возможны  
 Г) совместность событий  $A$  и  $B$

20. Вероятность  $P(A/B)$  это – ...

- А) вероятность события  $A$  при условии, что  $A$  и  $B$  противоположные события  
 Б) вероятность события  $A$  при условии, что  $A$  и  $B$  несовместные события  
 В) вероятность события  $A$  при условии, что событие  $B$  произошло  
 Г) произведение событий  $A$  и  $B$

21. Обязательным условием применения формулы  $P(AB)=P(A)P(B)$  является

- А) противоположность событий  $A$  и  $B$   
 Б) независимость событий  $A$  и  $B$   
 В) несовместность событий  $A$  и  $B$   
 Г) зависимость событий  $A$  и  $B$

22. Обязательным условием применения формулы  $P(AB)=P(A)P(A/B)$  является

- А) противоположность событий  $A$  и  $B$   
 Б) независимость событий  $A$  и  $B$   
 В) несовместность событий  $A$  и  $B$   
 Г) зависимость событий  $A$  и  $B$

23. Формула полной вероятности имеет вид:

$$\begin{array}{ll} \text{А)} P(A) = \sum_{i=1}^n P(A) \cdot P_{H_i}(A) & \text{Б)} P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P_A(H_i) \\ \text{В)} P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P_{H_i}(A) & \text{Г)} P(A) = \sum_{i=1}^n P(A) \cdot P_A(H_i) \end{array}$$

24. Вероятность появления события  $A$   $m$  раз в  $n$  повторных независимых испытаниях при  $n < 10$  определяется

- А) формулой Бернулли  
 Б) локальной теоремой Лапласа  
 В) интегральной теоремой Лапласа  
 Г) формулой Пуассона

25. Формула Бернулли имеет вид

$$\begin{array}{l} \text{А)} P_n(m) = C_m^n p^n q^{n-m} \\ \text{Б)} P_n(m) = C_n^m p^n q^m \\ \text{В)} P_n(m) = C_m^n p^n q^m \\ \text{Г)} P_n(m) = C_n^m p^n q^{n-m} \end{array}$$

26. Наивероятнейшим числом наступлений события  $A$  в  $n$  независимых испытаниях называется

- А) наибольшее число наступлений события  $A$   
 Б) наибольшая вероятность наступления события  $A$   
 В) число наступлений события  $A$  при наибольшем числе испытаний  
 Г) число наступлений события  $A$ , при котором вероятность наступления события  $A$  в  $n$  независимых испытаниях наибольшая

27. Формула для определения наивероятнейшего числа  $m_0$  имеет вид

- A)  $np - p \leq m_0 \leq np + p$
- Б)  $np - q \leq m_0 \leq np + q$
- В)  $np - q \leq m_0 \leq np + p$
- Г)  $q \leq m_0 \leq p$

28. Локальная теорема Лапласа позволяет вычислить

- А) наивероятнейшее число наступлений события в  $n$  независимых испытаниях
- Б) относительную частоту наступлений события в  $n$  независимых испытаниях
- В) вероятность появления события  $m$  раз в  $n$  независимых испытаниях ( $n > 10$ )
- Г) вероятность отклонения числа появлений события  $m$  от числа независимых испытаний  $n$

29. В локальной теореме Лапласа  $P \approx \frac{\varphi(x)}{\sqrt{npq}}$  аргумент функции  $\varphi(x)$  равен

- A)  $x = \frac{m}{\sqrt{npq}}$
- Б)  $x = \frac{m - np}{\sqrt{npq}}$
- Б)  $x = \frac{np}{\sqrt{npq}}$
- Г)  $x = m - np$

30. Интегральная теорема Лапласа позволяет вычислить

- А) вероятность появления события  $A$   $m$  раз в  $n$  испытаниях ( $n > 10$ )
- Б) вероятность появления события  $A$  в  $n$  испытаниях не менее  $a$ , но не более  $b$  раз ( $n > 10$ )
- В) наивероятнейшее число появлений события  $A$  в  $n$  независимых испытаниях ( $n > 10$ )
- Г) относительную частоту наступлений события  $A$  в  $n$  независимых испытаниях

31. В интегральной формуле Лапласа  $P(k_1 \leq m \leq k_2) = \Phi(x_2) - \Phi(x_1)$ , аргумент  $x_1$  равен

- A)  $x_1 = \frac{k_1 - np}{\sqrt{npq}}$
- Б)  $x_1 = \frac{k_1}{\sqrt{npq}}$
- Б)  $x_1 = \frac{np}{\sqrt{npq}}$
- Г)  $x_1 = k_1 - np$

32. В интегральной формуле Лапласа  $P(k_1 \leq m \leq k_2) = \Phi(x_2) - \Phi(x_1)$ , аргумент  $x_2$  равен

- A)  $x_2 = \frac{k_2 - np}{\sqrt{npq}}$
- Б)  $x_2 = \frac{k_2}{\sqrt{npq}}$
- Б)  $x_2 = \frac{np}{\sqrt{npq}}$
- Г)  $x_2 = k_2 - np$

33. Случайные величины делятся на

- А) переменные и постоянные
- Б) четные и нечетные
- В) рациональные и нерациональные
- Г) дискретные и непрерывные

34. Математическое ожидание дискретной случайной величины вычисляется по формуле

- A)  $\sum_{i=1}^n x_i$
- Б)  $\sum_{i=1}^n (x_i - p_i) \cdot x_i$
- Б)  $\sum_{i=1}^n x_i^2 \cdot p_i$
- Г)  $\sum_{i=1}^n x_i p_i$

35. Математическое ожидание случайной величины ( $c X + Y$ ), где  $c = \text{const}$ , а  $X, Y$  – независимые случайные величины, равно:

- А)  $cM(X) + M(Y)$
- Б)  $cM(X) - M(Y)$
- В)  $M(X) + M(Y)$
- Г)  $M(X) \cdot M(Y)$

36 Математическое ожидание постоянной величины  $C$  равно  
 А)  $C$       Б) 1      В) 0      Г) не определено

37. Математическое ожидание произведения двух независимых случайных величин  $X$  и  $Y$  равно

- А)  $M(X) + M(Y)$       Б)  $M(X) - M(Y)$       В)  $\frac{M(X)}{M(Y)}$       Г)  $M(X) \cdot M(Y)$

38. Дисперсия дискретной случайной величины определяется по формуле:

- А)  $\sum_{i=1}^n x_i p_i - (\sum_{i=1}^n x_i p_i)^2$       Б)  $\sum_{i=1}^n x_i^2 p_i - \sum_{i=1}^n x_i p_i$   
 Б)  $\sum_{i=1}^n x_i^2 p_i - (\sum_{i=1}^n x_i p_i)^2$       Г)  $\sum_{i=1}^n x_i p_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i p_i)^2$

39. Дисперсия случайной величины  $(cX+Y)$ , где  $c=\text{const}$ , а  $X, Y$  – независимые случайные величины, равно

- А)  $cD(X)+D(Y)$       Б)  $c^2D(X)+D(Y)$       В)  $D(X)+D(Y)$       Г)  $cD(X)-D(Y)$

40. Дисперсия разности двух независимых случайных величин  $X$  и  $Y$  равна:

- А)  $D(X)-D(Y)$       Б) 0      В)  $D(X)+D(Y)$       Г)  $D(X) \cdot D(Y)$

41. Дисперсия постоянной величины  $C$  равна

- А) 1      Б) С      В) 0      Г) не определена

42. Математическое ожидание квадрата отклонения  $M(X - M(X))^2$  равно

- А)  $D(X)$       Б)  $\delta(X)$       В)  $M(X)$       Г)  $V$

43. Дисперсия от математического ожидания  $D(M(X))$  равна

- А)  $M(X)$       Б) 0      В)  $X$       Г) 1

44. Среднее квадратическое отклонение  $\sigma(x)$  случайной величины  $X$  равно

- А)  $D(X)$       Б)  $\sqrt{M(X)}$       В)  $\sqrt{D(X)}$       Г)  $M(X)$

45. Математическое ожидание  $M(X)$  непрерывной случайной величины  $X$ , заданной на интервале  $(a,b)$ , определяется формулой:

А)  $M(x) = \int_a^b x^2 f(x) dx$       Б)  $M(x) = \int_a^b x f(x) dx$

46. Дисперсия  $D(X)$  непрерывной случайной величины, заданной на интервале  $(a, b)$ , определяется формулой

А)  $D(X) = \int_a^b x^2 f(x) dx - (M(X))^2$       Б)  $D(X) = \int_a^b (x - M(X))^2 dx$   
 Б)  $D(X) = \int_a^b (x - M(X)) \cdot f(x) dx$       Г)  $D(X) = \int_a^b (x - M(X)) dx$

47. Графическая форма задания закона распределения случайной величины – это

- А) парабола

Б) прямая линия

В) окружность

Г) полигон

48. Табличная форма задания закона распределения случайной величины называется

А) суммой распределения

Б) интегралом распределения

В) рядом распределения

Г) полем распределения

49. Дискретная случайная величина принимает ...:

А) только множество целых значений

Б) только множество положительных значений

В) все значения из интервала  $(-\infty; +\infty)$

Г) конечное или бесконечное счетное множество значений

50. Непрерывная случайная величина принимает

А) множество целых значений

Б) множество рациональных значений

В) конечное множество значений

Г) любое значение из конечного или бесконечного интервала

51. Если  $X$  – непрерывная случайная величина,  $a$  и  $b$  – конкретные значения, то отсюда следует, что

А)  $P(a \leq X < b) \neq P\{a < X \leq b\}$

Б)  $P(a < X \leq b) \neq P(a < X < b)$

В)  $P(a < X < b) \neq P(a \leq X \leq b)$

Г)  $P(a \leq X < b) = P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b) = P(a < X < b)$

52. Если  $f(x)$  – плотность распределения, то  $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$  равен

А)  $\infty$

Б)  $-1$

В)  $0$

Г)  $1$

53. Если  $f(x)$  – плотность распределения, то  $\int_{-\infty}^x f(x)dx$  определяет

А)  $M(X)$

Б)  $D(X)$

В)  $\sigma(X)$

Г)  $F(X)$

54. Функция распределения случайной величины  $X$  задается формулой:

А)  $F(x) = P(X > x)$

Б)  $F(x) = P(X = x)$

В)  $F(x) = P(X < x)$

Г)  $F(x) = X$

55. Дискретная случайная величина, выражающая число появления события А в  $n$  независимых испытаниях, проводимых в равных условиях и с одинаковой вероятностью появления события в каждом испытании, называется распределенной по ... :

- A) нормальному закону  
 Б) по закону Пуассона  
 В) биномиальному закону  
 Г) по показательному закону

56. Если случайная величина имеет биномиальное распределение,  $n$  – число независимых испытаний, а  $p$  – вероятность наступления события, то математическое ожидание вычисляется по формуле

A)  $M(X)=n$       Б)  $M(X)=p$       В)  $M(X)=npq$       Г)  $M(X)=np$

57. Если случайная величина имеет биномиальное распределение,  $n$  – число независимых испытаний, а  $p$  – вероятность наступления события, то дисперсия случайной величины вычисляется по формуле

A)  $D(X)=npq$       Б)  $D(X)=np$       В)  $D(X)=n-p$       Г)  $D(X)=p$

58. Математическое ожидание равномерно распределенной случайной величины вычисляется по формуле

A)  $M(X)=\frac{a-b}{2}$       Б)  $M(X)=\frac{a+b}{2}$       В)  $M(X)=\frac{b-a}{2}$       Г)  $M(X)=a+b$

59. Дисперсия равномерно распределенной случайной величины вычисляется по формуле

A)  $D(X)=b-a$       Б)  $D(X)=b+a$       В)  $D(X)=\frac{(b-a)^2}{12}$       Г)  $D(X)=\frac{(b-a)}{12}$

60. Вероятность попадания равномерно распределенной случайной величины в интервал  $[\alpha; \beta] \subset [a, b]$  вычисляется по формуле:

A)  $P(\alpha \leq X \leq \beta) = \frac{\alpha + \beta}{a + b}$       Б)  $P(\alpha \leq X \leq \beta) = \frac{\alpha - \beta}{a + b}$

В)  $P(\alpha \leq X \leq \beta) = \frac{\beta - \alpha}{a + b}$       Г)  $P(\alpha \leq X \leq \beta) = \frac{\beta - \alpha}{b - a}$

61. Плотность распределения случайной величины с показательным распределением имеет вид:

A)  $f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$       Б)  $f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \lambda e^{\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$

В)  $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x < 0, \\ 0, & x \geq 0 \end{cases}$       Г)  $f(x) = e^{\lambda x}$

62. Функция распределения случайной величины с показательным распределением имеет вид:

A)  $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ e^{\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$       Б)  $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$

В)  $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$       Г)  $F(x) = e^{\lambda x}$

63. У показательного распределения математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение

- А) всегда различны
- Б) всегда различаются на единицу
- +В) всегда равны

64. Функция плотности нормального распределения с математическим ожиданием  $a$  и средне – квадратическим отклонением  $\sigma$  задается формулой:

$$A) f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$

$$B) f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$

$$B) f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\Gamma) f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{\sigma^2}}$$

65. График плотности нормального распределения называется

- А) кривой Гаусса
- Б) кривой Бернулли
- В) кривой Пауссона
- Г) кривой Лапласа

66. В точке  $x=a$  кривая Гаусса имеет

- А) точку перегиба
- Б) точку минимума
- В) точку разрыва
- Г) точку максимума

67. Точки  $x_1 = a - \sigma$  и  $x_2 = a + \sigma$  являются для кривой Гаусса

- А) точками перегиба
- Б) точками максимума
- В) точками минимума
- Г) точками разрыва

68. Параметрами нормального распределения являются:

- А) математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение
- Б) функция распределения и функция плотности распределения
- В) функция  $p(x)$  и  $\Phi(x)$
- Г) дисперсия и среднеквадратическое отклонение

69. Генеральная совокупность – это ...

- А) вся исследуемая совокупность объектов
- Б) совокупность случайно отобранных объектов
- В) совокупность объектов, выбранных через определенный интервал
- Г) совокупность из непересекающихся групп

70. Выборочная совокупность – это ...

- А) совокупность из непересекающихся групп
- Б) совокупность случайно отобранных объектов
- В) вся исследуемая совокупность объектов
- Г) совокупность объектов, выбранных через определенный интервал

71. Объем выборки – это ...

- А) число, равное количеству объектов генеральной или выборочной совокупности
  - Б) число, равное среднему арифметическому объектов
  - В) число, равное максимальному значению совокупности
  - Г) число, равное минимальному значению совокупности

72. При повторном отборе зарегистрированные и обследованные единицы

- А) вновь возвращаются в генеральную совокупность и снова могут принять участие в дальнейшем отборе
  - Б) в генеральную совокупность не возвращаются
  - В) в генеральную совокупность возвращаются, но принять участие в дальнейшем отборе не могут
  - Г) помечаются специальным знаком

73. При бесповторном отборе зарегистрированные и обследованные единицы

- А) возвращаются в генеральную совокупность
  - Б) не возвращаются в генеральную совокупность
  - В) возвращаются в генеральную совокупность и могут принять участие в дальнейшем отборе

74. Графическая форма задания закона распределения случайной величины – это






77 – это разность между наибольшей и наименьшей вариантой

77. ... это разность между наибольшей и наименьшей

78. Формула Стерджесса имеет вид ...

- А)  $k=3,32 \lg n$       Б)  $k=1+3,32 \lg n$       В)  $k=1-3,32 \lg n$

79. Выборочная средняя вычисляется по формуле

$$\text{A) } \bar{x}_B = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i \cdot n_i \quad \text{B) } \bar{x}_B = \sum_{i=1}^k x_i \cdot n_i \quad \text{B) } \bar{x}_B = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i^2 \cdot n_i$$

80. Выборочная дисперсия вычисляется по формуле

$$A) D_B = \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x}_B)^2 \cdot n_i \quad B) D_B = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x}_B)^2 \cdot n_i \quad C) D_B = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x}_B) \cdot n_i$$

### **3.2. Вопросы к экзамену и зачету в устной форме**

## Раздел 1. Элементы линейной и векторной алгебры

1. Понятие и виды матриц. Транспонированная матрица.
  2. Операции над матрицами и их свойства.

3. Обратная матрица и ее свойства.
4. Определитель матрицы и его свойства.
5. Миноры и алгебраические дополнения элементов определителя. Теорема о разложении определителя по элементам строки или столбца.
6. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса.
7. Решение систем линейных уравнений методом обратной матрицы.
8. Решение систем линейных уравнений с помощью формул Крамера.
9. Векторы. Операции над векторами и их свойства.
10. Действия над векторами, заданными своими координатами.
11. Скалярное произведение двух векторов и его свойства.
12. Векторное произведение двух векторов и его свойства.
13. Смешанное произведение трех векторов и его свойства.

## **Раздел 2. Аналитическая геометрия на плоскости**

1. Уравнение прямой на плоскости: способы задания.
2. Уравнение прямой с угловым коэффициентом.
3. Общее уравнение прямой, его частные случаи.

## **Раздел 3. Введение в анализ**

1. Числовые последовательности и способы их задания.
2. Предел числовой последовательности. Теоремы о пределах числовых последовательностей.
3. Предел функции. Непрерывность функции.
4. Понятие производной и ее геометрический смысл.
5. Теоремы дифференциального исчисления.
6. Производная сложной и обратной функции.
7. Дифференциал функции и его геометрический смысл.
8. Исследование функций с помощью первой производной.
9. Исследование функций с помощью второй производной.

## **Раздел 4. Интегральное исчисление функций одной независимой переменной**

1. Первообразная функция и неопределенный интеграл.
2. Вычисление неопределенных интегралов.
3. Методы вычисления неопределенных интегралов: метод подстановки.
4. Методы вычисления неопределенных интегралов: метод интегрирования по частям.
5. Интегрирование рациональных дробей.

## **Раздел 5. Функции нескольких переменных**

1. Понятие функциональной зависимости между несколькими переменными.
2. Предел и непрерывность функции двух независимых переменных.
3. Частные производные функции нескольких переменных.
4. Экстремумы функции двух независимых переменных.

## **Раздел 6. Теории вероятностей и основы математической статистики**

1. Комбинаторика: размещения, сочетания, перестановки. Размещения, сочетания и перестановки с повторениями. Примеры.
2. Предмет и основные определения теории вероятностей.
3. Классическое определение вероятности. Свойства вероятности, вытекающие из классического определения. Примеры.
4. Статистическое определение вероятности, его особенности и связь с классическим определением.
5. Зависимые и независимые события. Условные и безусловные вероятности.

6. Теоремы умножения вероятностей.
  7. Теоремы сложения вероятностей.
  8. Формула полной вероятности. Формула Байеса.
  9. Формула Бернулли. Биномиальное распределение. Наивероятнейшее число появлений события.
  10. Приближенные формулы в схеме Бернулли (формула Пуассона, локальная и интегральная теоремы Лапласа).
  11. Случайные величины и случайные события.
  12. Дискретные и непрерывные случайные величины. Закон распределения случайной величины и способы его задания.
  13. Числовые характеристики случайных величин.
  14. Математическое ожидание случайной величины. Его смысл и примеры. Свойства математического ожидания.
  15. Дисперсия и среднее квадратическое отклонение случайной величины. Их смысл и примеры вычисления. Формулы для вычисления дисперсии. Свойства дисперсии.
  16. Математическое ожидание, дисперсия и среднее квадратическое отклонение частоты и частости.
  17. Важнейшие распределения случайных величин.
  18. Нормальное распределение. Плотность нормального распределения и ее свойства.
- Функция распределения нормально распределенной случайной величины.
19. Нормированное (стандартное) нормальное распределение.
  20. Функция Лапласа: график, свойства, таблицы.
  21. Вероятность попадания нормально распределенной случайной величины в заданный интервал.
  22. Предмет и основные задачи математической статистики.
  23. Генеральная и выборочные совокупности случайных величин. Первичная обработка выборочных данных группировка, построение гистограммы распределения случайных величин.
  24. Эмпирические интегральная и дифференциальная функции распределения. Их свойства.
  25. Выборочные числовые характеристики случайных величин (точечные оценки) дисперсии, математического ожидания, коэффициентов асимметрии, эксцесса, корреляции.

### **3.3. Образцы контрольных работ по темам**

#### **Раздел 1. Элементы линейной и векторной алгебры**

##### *Контрольная работа №1. Матрицы. Определители*

1. Даны матрицы  $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & -1 & 4 \\ 5 & 2 & 6 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ .

Вычислить: 1)  $2A + BC$ ; 2)  $B^T + C$ ; 3)  $A^2$ ; 4)  $AB + 4B$ ; 5)  $B + 3C$ .

2. Вычислить следующие определители:

a)  $\begin{vmatrix} 3 & -1 & -4 \\ 2 & 5 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix}$ , б)  $\begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & -2 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 5 \\ 2 & -1 & 3 & 4 \end{vmatrix}$

3. Данна матрица:  $A = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ . Показать, что  $(A^{-1})^{-1} = A$ .

4. Определить при каких  $\lambda$  существует матрица, обратная данной:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & \lambda & -1 \\ 1 & 3 & 4 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

5. Найти матрицу, обратную матрице:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Контрольная работа №2. Векторная алгебра

Даны координаты четырех точек:

$$A(1; -3; 1), B(2; 1; 2), C(-1; 3; 2), D(1; 1; 3)$$

Найти:

- 1) координаты векторов  $\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{CD}$ ,  $2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{CD}$ ;
- 2) длины векторов  $\overrightarrow{AC}$ ,  $\overrightarrow{BD}$ ,  $2\overrightarrow{BC} - 3\overrightarrow{AD}$ ;
- 3) скалярное произведение векторов  $\overrightarrow{AB}$  и  $\overrightarrow{AC}$ ;
- 4) косинус угла между векторами  $\overrightarrow{BC}$  и  $\overrightarrow{BD}$ ;
- 5) проекцию вектора  $\overrightarrow{AB}$  на направление вектора  $\overrightarrow{CD}$ ;
- 6) векторное произведение векторов  $\overrightarrow{AB}$  и  $\overrightarrow{AD}$ ;
- 7) площадь треугольника  $ABD$ ;
- 8) синус угла между векторами  $\overrightarrow{AB}$  и  $\overrightarrow{CD}$ ;
- 9) смешанное произведение  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} \cdot \bar{b}$ , где  $\bar{b} = \bar{i} - 2\bar{j} + 4\bar{k}$ ;
- 10) объем пирамиды  $ABCD$ , длину высоты, опущенной из вершины  $B$ .

**Раздел 2. Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве**

Контрольная работа №3. Аналитическая геометрия на плоскости

Даны координаты вершин треугольника  $ABC$ :

$$A(3; 2), B(-4; 3), C(-1; -2)$$

Требуется составить уравнения:

- 1) стороны  $AB$ ;
- 2) медианы  $AK$ , проведенной из точки  $A$ ;
- 3) высоты  $BM$ , проведенной из точки  $B$ .

Сделать чертеж в системе координат.

**Раздел 3. Введение в анализ**

Контрольная работа №4. Предел функции

Вычислить пределы:

$$\begin{array}{lll} 1) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^2 - x - 10}{x^2 + 3x + 2} & 2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 5x^4 + 4}{3x^3 + 2x^2 + 5} & 3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9-x} - 3}{\sqrt{x+4} - 2} \\ 4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 6x}{4x^2} & 5) \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{2x-3}{2x+5} \right)^{x-1} & 6) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 - 5x + 1}{3x - x^2 - 2} \\ 7) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(2x^2 - x - 1)^2}{x^3 + 2x^2 - x - 2} & 8) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{x+1} - \sqrt[3]{3x+1}) & 9) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x \sin x} \end{array}$$

Контрольная работа №5. Производная функции и ее применение

1. Найти производные первого порядка данных функций, используя правила вычисления производных:

$$\begin{array}{lll}
1) \ y = 2x^5 - \frac{4}{x^3} + \frac{1}{x} + 3\sqrt{x}; & 2) \ y = \sqrt{x} \cdot \operatorname{tg} 3x; & 3) \ y = \frac{\ln x}{4 - 3 \cos x}; \\
4) \ y = (\sin x)^{\operatorname{arctg} x}; & 5) \ \begin{cases} x = \arcsin 2t, \\ y = \frac{1}{1 - 4t^2}; \end{cases} & 6) \ y = x + \operatorname{arctg} y.
\end{array}$$

2. Вычислить пределы, используя правило Лопиталя:

$$\begin{array}{ll}
1) \ \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)^2}{\sin^2(x-3)}; & 2) \ \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \sin \frac{1}{x}.
\end{array}$$

3. Построить график функции  $y = f(x)$ , используя общую схему исследования:

$$y = \frac{4x^3 - 3x}{4x^2 - 1}.$$

#### Раздел 4. Интегральное исчисление функций одной независимой переменной

##### Контрольная работа №6. Неопределенный и определенный интегралы

Вычислить неопределенные интегралы:

$$\begin{array}{lll}
1) \ \int (3^x + \sqrt[3]{x} - \frac{1}{x}) dx; & 2) \ \int (\frac{1}{\sqrt[3]{x}} + \frac{2}{\sqrt{x}}) dx; & 3) \ \int \frac{xdx}{\sqrt{x^2 + 7}}; \\
4) \ \int (2x-5)e^{3x} dx; & 5) \ \int \frac{7-3x}{x^2-4x+8} dx; & 6) \ \int \frac{xdx}{x^2-5x+6};
\end{array}$$

#### Раздел 5. Функции нескольких переменных

##### Контрольная работа №7. Функции нескольких переменных

1. Найти полный дифференциал функции  $u = \cos^2(x^2y + y^3z^4 + zx^2)$ .
2. Найти дифференциал 2-ого порядка функции  $z = \sin(xy^3 - y^2)$ .
3. Найти частные производные от сложной функции по  $u, v$ :  $z = x^4y^6$ , где  $x = \cos^2(u+v)$ ,  $y = \sin^3(u-2v)$ .
4. Найти частные производные от неявной функции по  $x, y$ :  $e^{2z} + (x+y)^2 - yz^3 = 0$ .
5. Исследовать на экстремум функцию  $z = \frac{1}{2}x^2 - 4xy + 9y^2 + 3x - 14y + \frac{1}{2}$ .
6. Исследовать на условный экстремум функцию  $z = x^2 + y^2$  при  $x + y = 3$  ( $x > 0, y > 0$ ) методом Лагранжа.

#### Раздел 6. Элементы теория вероятностей и математической статистики

##### Контрольная работа №8. Теория вероятностей

1. В группе 16 студенток и 6 студентов. Найти вероятность того, что среди четырех наугад выбранных учащихся окажется одна студентка и 3 студента.
2. Среди сотрудников фирмы 28% знают английский язык, 30% – немецкий, 42% – французский; английский и немецкий – 8%, английский и французский – 10%, немецкий и французский – 5%, все три языка – 3%. Найти вероятность того, что случайно выбранный сотрудник фирмы: а) знает английский или немецкий; б) знает английский, немецкий или французский; в) не знает ни один из перечисленных языков.
3. В магазине имеются в продаже однотипные изделия, изготовленные двумя заводами. Заводом №1 изготовлены 60% изделий, а остальные изготовлены заводом №2. Завод №1 в среднем выпускает 2% брака, а завод №2 – 5% брака. Какова вероятность того, что купленное в магазине изделие окажется бракованым?

4. Производиться испытание пяти приборов, каждый из которых выходит из строя с вероятностью 0,1. Найти вероятность того, что хотя бы два прибора выйдут из строя при испытании.

5. Фабрика выпускает 70% изделий высшего сорта. Найти вероятность того, что в партии из 1000 изделий число первосортных заключено между 652 и 760.

6. Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение случайной величины, заданной законом распределения:

$X$	2	3	5
$p$	0,1	0,6	0,3

7. Непрерывная случайная величина задана функцией распределения вероятностей  $F(x)$ . Требуется: а) найти плотность распределения вероятностей  $f(x)$ , б) найти математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение; в) вычислить вероятность попадания случайной величины в интервал  $(1; 4)$ ; г) построить графики функции распределения  $F(x)$  и плотности распределения  $f(x)$ .

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{где } x \leq 0, \\ \frac{x^2}{25}, & \text{где } 0 < x \leq 5, \\ 1, & \text{где } x > 5. \end{cases}$$

#### Контрольная работа №9. Основы математической статистики

Известны  $X_1, X_2, \dots, X_n$  – результаты независимых наблюдений над случайной величиной  $X$ .

##### Задание

1. Сгруппировать эти данные в интервальную таблицу.
2. Построить гистограмму, полигон частот и эмпирическую функцию распределения.
3. Найти и построить моду и медиану.
4. Найти несмещенную оценку математического ожидания и дисперсии случайной величины  $X$ .
5. Найти интервальные оценки математического ожидания и дисперсии случайной величины  $X$  с надежностью  $\gamma = 0,99$  и  $\gamma = 0,95$ .

## **4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ**

Лекции оцениваются по посещаемости, активности, умению выделить главную мысль.

Практические занятия оцениваются по самостоятельности выполнения работы, грамотности в оформлении, правильности выполнения.

Самостоятельная работа оценивается по качеству и количеству выполненных домашних или контрольных работ, грамотности в оформлении, правильности выполнения.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, зачета с оценкой и экзамена.

Для получения зачета и экзамена студент очной формы обучения должен в течение семестра активно посещать лекции и принимать участие в обсуждении вопросов касающихся изучаемой темы, выполнить и защитить отчеты по практическим занятиям.

Для получения зачета и экзамена студент заочной формы обучения должен написать контрольную работу, активно посещать лекции и принимать участие в обсуждении вопросов касающихся изучаемой темы, выполнить и защитить отчеты по практическим занятиям.

Критерии оценки зачета и экзамена могут быть получены в тестовой форме: количество баллов или удовлетворительно, хорошо, отлично. Для получения соответствующей оценки на зачете и экзамене по курсу используется накопительная система бально-рейтинговой работы

студентов. Итоговая оценка складывается из суммы баллов или оценок, полученных по всем разделам курса и суммы баллов полученной на зачете и экзамене.

Таблица 4.1 - Критерии оценки уровня знаний студентов с использованием теста на зачете или экзамене по учебной дисциплине

Оценка	Характеристики ответа студента
Отлично	86-100 % правильных ответов
Хорошо	71-85 %
Удовлетворительно	51- 70%
Неудовлетворительно	Менее 51 %

Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовлетворительно».

Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «не удовлетворительно».

Количество баллов и оценка неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично определяются программными средствами по количеству правильных ответов к количеству случайно выбранных вопросов.

Критерии оценивания компетенций следующие

1. Ответы имеют полные решения (с правильным ответом). Их содержание свидетельствует об увереных знаниях обучающегося и о его умении решать профессиональные задачи, оценивается в 5 баллов (отлично);
2. Более 75 % ответов имеют полные решения (с правильным ответом). Их содержание свидетельствует о достаточных знаниях обучающегося и его умении решать профессиональные задачи – 4 балла (хорошо);
3. Не менее 50 % ответов имеют полные решения (с правильным ответом). Их содержание свидетельствует об удовлетворительных знаниях обучающегося и о его ограниченном умении решать профессиональные задачи, соответствующие его будущей квалификации – 3 балла (удовлетворительно);
4. Менее 50 % ответов имеют решения с правильным ответом. Их содержание свидетельствует о слабых знаниях обучающегося и о его неумении решать профессиональные задачи – 2 балла (неудовлетворительно).